

Może być wykonywane w połączeniu z nieinwazyjną diagnostyką obrazową – usg miednicy mniejszej (ang. pelvic floor sonography). Każde z tych badań dostarcza innych informacji. Połączenie ich pozwala na postawienie kompleksowej diagnozy. Stosowane jest do określenia przyczyn nieprawidłowości, jakie występują w zakresie cewki moczowej i pęcherza moczowego. Służy do ustalenia pojemności pęcherza moczowego oraz subiektywnego odczuwania jego wypełnienia. W badaniu urodynamicznym można określić sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu pęcherza moczowego, ale także prawidłowość koordynacji pomiędzy wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej. Wykonywane jest w przypadkach braku poprawy w trakcie leczenia zachowawczego lub niepowodzeń po operacji czy też przed planowanym zabiegiem. Badanie to wykonuje się m. in. w celu bardziej optymalnego doboru rodzaju zabiegu przed operacjami leczącymi nietrzymanie moczu oraz wypadanie macicy i pochwy. Diagnostykę ukrytego nietrzymania moczu wykonuje się bez repozycji, a następnie z repozycją przedniej ściany pochwy u kobiet z obniżeniem w obrębie kompartmentu przedniego w celu wyprostowania zagięcia cewki moczowej, aby porównać występowanie nieprawidłowych objawów lub powstanie nowych. Rozpoznanie ukrytego nietrzymania moczu pozwala na poinformowanie pacjentki o zwiększonym prawdopodobieństwie występowania NTM po skutecznej operacji naprawczej, ewentualnie na równoczesne zastosowanie operacji leczącej NTM i zaburzenia statyki. U niektórych chorych sytuacja jest na tyle skomplikowana, że wymaga bardziej złożonej, kompleksowej diagnostyki. Niestety badanie urodynamiczne, jak zresztą każdy rodzaj diagnostyki w dniu dzisiejszym, ma swoje niedoskonałości, pomimo wykonywania go przy użyciu najnowocześniejszej aparatury. Dlatego istotne znaczenie ma doświadczenie i kwalifikacje personelu. Pomimo uzyskaniu wielu istotnych, obiektywnych informacji w badaniu urodynamicznym, diagnoza i leczenie nietrzymania moczu powinno być oparte przede wszystkim na klinicznym doświadczeniu, a nie tylko na urodynamicznych parametrach.

Z jakich etapów składa się badanie urodynamiczne?

Badanie urodynamiczne składa się z kilku etapów:

- przepływ cewkowy (uroflometria) z oceną zalegania moczu po mikcji,
- cystometria,
- profilometria.

Nie u wszystkich chorych badanie urodynamiczne będzie wyglądało tak samo. Dobór poszczególnych elementów diagnostycznych przeprowadza się indywidualnie, po analizie danych uzyskanych z wcześniej zebranego wywiadu, z badania klinicznego, usg uroginekologicznego, itd.

Badanie urodynamiczne w województwie śląskim

W najnowszym numerze prezentujemy Państwu listę pracowni urodynamicznych z województwa śląskiego.

Według zebranych danych (stan na 09.2011) w województwie śląskim pełne badanie urodynamiczne wykonuje obecnie 8 placówek, w tym jedna z pracowni przeprowadza badanie urodynamiczne tylko u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Średni czas oczekiwania na badanie waha się od jednego miesiąca do pół roku, zdarzają się jednak placówki, w których czas oczekiwania na badanie przekracza rok. Czas oczekiwania na badanie uzależnione jest od tego czy jest ono refundowane przez NFZ czy opłacane przez pacjenta (koszt badania wynosi ok. 500 zł).

Biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia w województwie (4 638 tys. mieszkańców) na jedną pracownię przypada ok. 579 tys. pacjentów. Wynik ten nie jest zadowalający, w porównaniu do regionów o podobnej liczbie mieszkańców. Porównując obecne dane ze statystykami sprzed czterech lat, liczba pracowni urodynamicznych nie zmieniła się. W następnym numerze Kwartalnika NTM zaprezentujemy Państwu listę pracowni urodynamicznych z województwa dolnośląskiego.

Wykaz placówek wykonujących badania urodynamiczne na terenie całego kraju dostępny jest na stronie internetowej www.ntm.pl. Lista powstała w oparciu o informacje uzyskane od przedstawicieli prezentowanych placówek. W razie jakichkolwiek sugestii dotyczących uzupełnienia prezentowanej listy prosimy o kontakt na adres mailowy: ntm@ntm.pl.

Bytom

1. Szpital Specjalistyczny Nr 2, Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej; 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15

Chorzów

1. Śląskie Centrum Urologii „UROVITA”; 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 (refundowane dla pacjentów placówki)

Częstochowa

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. L. Rydygiera; 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15

Katowice

1. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Chirurgii i Urologii; 40-752 Katowice, ul. Medyków 16 (tylko dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż)
2. Szpital im. prof. E. Michałowskiego SP ZOZ; 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9

Rybnik

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 3, Oddział Urologiczny; 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

Zabrze

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; 41-800 Zabrze, 3 Maja 13-15

Żory

1. NZOZ MED-ART Poradnie Specjalistyczne; 40-244 Żory, os. ks. Władysława 27

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w placówkach